

4 982178 131112

アスリキ内服液

使用上の注意

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止しこの製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

大人1日1回1本(30mL)服用
●用法・用量を守ってください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- 生薬成分含有のため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に影響はありません。よく振ってから服用してください。



アスリキ

内服液

かぜなどの発熱による
体力を消耗した時の
栄養補給に

第3類医薬品 30mL

発売元 総合メディカル株式会社
福岡県福岡市中央区大名2-9-23

SOGO MEDICAL GROUP

成分・分量1日量(30mL)中

ゴウチンキ200μL
(原生薬ゴウチンとして2mg)
ニンジンエキス55mg
(原生薬ニンジンとして610.5mg)
チアミン塩化物塩酸塩10mg
リボフラビン2mg
ピリドキシン塩酸塩5mg
無水カフェイン50mg

添加物としてクエン酸、クエン酸Na、dl-リンゴ酸、ブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、バラベン、プロピレングリコール、香料、カラメルを含有。
(アルコール0.3mL以下)

ガラス:瓶 金属:キャップ

製造販売元 萬金薬品工業株式会社
奈良県高市郡明日香村野口317

お客様相談室
TEL:0744-54-2012
AM8:30~PM5:00 土、日、祝日を除く

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

使用
期限

製造
番号