

Easy to grip easy to open

新大和漢方株主有限会社
ヤ漢方／＼基 健康食品
警／研究開発／＼漢方／

新大和漢方株式会社



湧
精
金

ゆうせいじょう

第3類医薬品 63錠(7日分)

開封後はチャックを閉めて保存してください。

ご使用の際には、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品 新大和漢方 しんやまとかんぽう

内容量 63錠

販売名：湧精錠A ゆうせいじょうえーす

(7日分)

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

2.1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感、軟便、下痢

効能・効果

○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

次の量を1日3回服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

成人1日の服用量9錠(1錠360mg)中に次の成分を含みます。

肝臓加水分解物	600mg
L-アルギニン塩酸塩	200mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	200mg
無水カフェイン	50mg
L-グルタミン酸ナトリウム	40mg
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1)	25mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2)	12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	10mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、リン酸水素Ca、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム末、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、カルメロースNa、カルナウバロウを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様窓口】(商品に関するご質問・お問い合わせ)

☎ 0120-702-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

【発売元】

新大和漢方株式会社

福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

【製造販売元】

美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692

製造番号

使用期限

紙：ラベル

TO-B2 

▲▲ つかめて開けやすい ▲▲

Easy to grip easy to open

湧精錠

ゆ
う
せ
い
じ
ょ
う

新大和漢方株式会社



新大和漢方株式会社
や漢方ノ書ニ基キ
研究開発ナリ
漢方ノ

第3類医薬品

90錠(10日分)

開封後はチャックを閉めて保存してください。

ご使用の際には、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品 新大和漢方 しんやまとかんぼう

内容量 90錠

販売名：湧精錠A ゆうせいじょうえーす

(10日分)

■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

2.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

⚠ 使用上の注意

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感、軟便、下痢

効能・効果

○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

次の量を1日3回服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

成人1日の服用量9錠(1錠360mg)中に次の成分を含みます。

肝臓加水分解物	600mg
L-アルギニン塩酸塩	200mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	200mg
無水カフェイン	50mg
L-グルタミン酸ナトリウム	40mg
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1)	25mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2)	12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	10mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、リン酸水素Ca、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム末、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、カルメロースNa、カルナウバロウを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様窓口】(商品に関するご質問・お問い合わせ)

☎ 0120-702-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

【発売元】

新大和漢方株式会社
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

【製造販売元】

美吉野製薬株式会社
奈良県吉野郡大淀町大岩692

製造番号

使用期限

紙：ラベル

TO-B2 