


第3類医薬品



RYUPIN EXCEL

肝臓加水分解物



- L-アルギニン 塩酸塩
- ビタミンB1、B2、B6
- L-グルタミン酸 ナトリウム
- L-アスパラギン酸 マグネシウム・カリウム

ご使用の際には、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労時の栄養補給に

第3類医薬品 販売名：リューピン®エクセル 肝臓加水分解物・L-アルギニン塩酸塩配合

リューピンエクセル(糖衣錠)は、新鮮な哺乳動物の肝臓を酵素で分解して得られた肝臓加水分解物(天然の amino 酸)に、病中病後、肉体疲労時に消耗されるアルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸などの amino 酸、更にはビタミンB1誘導体のフルスルチアミン塩酸塩をはじめとするビタミンB群の働きにより、肉体疲労、病中病後、発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給に優れた効果のある滋養強壮保健薬です。



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感、軟便、下痢

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

△ 使用上の注意

成分・分量

成人1日の服用量9錠(1錠360mg)中に次の成分を含みます。

肝臓加水分解物 600mg
L-アルギニン塩酸塩 200mg
L-グルタミン酸ナトリウム 40mg
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB1) 25mg
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB2) 12mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) 10mg
無水カフェイン 50mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム 200mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、リン酸水素Ca、無水クエイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロス、アラビアゴム末、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、カルメロースNa、カルナウバロウを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。

(本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステルによるものです。)

用法・用量

次の1回量を1日3回服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	3 錠	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

効能・効果

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患、妊娠授乳期などの場合の栄養補給

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

美吉野製薬株式会社

お客様相談窓口 電話 0745-67-0144
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝祭日を除く)

製造販売元

美吉野製薬株式会社 奈良県吉野郡大淀町大岩692

販売元

株式会社バイオセーフ 東京都足立区梅島3-6-12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



版No.01



4 909720 522037

使用期限

製造番号