

第2類医薬品

販売名:ビタタイム黄W液

ビタタイム黄W液は滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給などに効果がある、辛味のあるドリンク剤です。

ハンピ、ゴオウ、ローヤルゼリーなどの動物性生薬とニンジン、ジオウなどの植物性生薬にV.B1、V.B2、V.B6、V.Eなどのビタミンを配合してあります。

[成分・分量] 1びん(50mL)中

チアミン硝酸物……………10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム……………10mg

ピリドキシン塩酸塩……………20mg

ニコチン酸アミド……………20mg

パンテノール……………20mg

トコフェロール酢酸エステル……………20mg

無水カフェイン……………50mg

タウリン……………500mg

ローヤルゼリー……………100mg

ニンジン乾燥エキス……………90mg

ジオウ乾燥エキス……………60mg

セイヨウサンザシエキス……………10mg

ゴオウチンキ……………500μL

シベットチンキ……………500μL

ハンピチンキ……………200μL

(アルコール1.0mL以下)

添加物:安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、エタノール、白糖、還元麦芽糖水アメ

<成分・分量に関連する注意>

●本剤の服用に際して、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。

●生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

滋養強壮

ビタタイム 黄W液

50 mL

第2類医薬品

Vitatin
time



Vita
time

Vita
itatin



VITATIME KO-W

OPEN

YONEDA YAKUHIN CO., LTD.

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。

また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[用法・用量]

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1びん (50mL)	1日1回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。






米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2

お客様相談窓口 電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

FOR NUTRITION
AND INVIGORATION

VITATIME
KO-W
SOLUTION

50mL

Vitatin
time 
Vita
time 
Vita 
itatin

YONEDA YAKUHIN CO.,LTD.