

滋養強壮・栄養補給

ヘルビタ 紅G液 KO-G

紅参エキス配合

原生薬換算量 1,500mg (1本中)

6年根
紅参

第3類医薬品

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[用法・用量]

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1びん (50mL)	1日1回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
- 滋養強壮
- 虚弱体質

米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社
お客様相談窓口
電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

第3類医薬品

販売名:ヘルビタ紅G液

[成分・分量] 1びん(50mL)中
コウジンエキス……………600mg
(原生薬として 1,500mg)
オウギエキス……………50mg
(原生薬として 200mg)
ショウキョウエキス……………97mg
(原生薬として 999.1mg)
ゴミシ流エキス……………0.2mL
(原生薬として 200mg)
クコシエキス……………100mg
(原生薬として 400mg)
タイソウエキス……………400mg
(原生薬として 1,000mg)
ロクジョウチンキ……………0.05mL
(原生薬として 15mg)
セイヨウサンザシエキス…30mg
(原生薬として 210mg)
リポフラビリン酸エステルナトリウム…5mg
ピリドキシン塩酸塩……………10mg
ニコチン酸アミド……………25mg
無水カフェイン……………50mg
(アルコール 0.32mL以下)

添加物: D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、エタノール、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、アセスルファミカリウム、還元麦芽糖水アメ、デキストリン、香料

<成分・分量に関連する注意>

- 本剤の服用に際して、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるため心配はありません。
- 生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

第3類医薬品

高麗紅蔘

紅蔘エキス 原生薬換算量
1,500mg 配合

六年根
高麗
紅蔘

ヘルピタ紅G液

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[用法・用量]

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1びん (50mL)	1日1回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
- 滋養強壮
- 虚弱体質

米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社
お客様相談窓口
電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

第3類医薬品

販売名:ヘルピタ紅G液

[成分・分量] 1びん(50mL)中
コウジンエキス……………600mg
(原生薬として 1,500mg)
オウギエキス……………50mg
(原生薬として 200mg)
ショウキョウエキス……………97mg
(原生薬として 999.1mg)
ゴミシ流エキス……………0.2mL
(原生薬として 200mg)
クコシエキス……………100mg
(原生薬として 400mg)
タイソウエキス……………400mg
(原生薬として 1,000mg)
ロクジョウチンキ……………0.05mL
(原生薬として 15mg)
セイヨウサンザシエキス…30mg
(原生薬として 210mg)
リポフラビンリン酸エステルナトリウム…5mg
ピリドキシン塩酸塩……………10mg
ニコチン酸アミド……………25mg
無水カフェイン……………50mg
(アルコール 0.32mL以下)

添加物: D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、エタノール、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、アセスルファムカリウム、還元麦芽糖水アメ、デキストリン、香料

<成分・分量に関連する注意>

- 本剤の服用に際して、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるため心配はありません。
- 生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931