



# かぜなどで熱が出て 体がだるい 食欲がない こんな時の栄養補給に!

甘草エキス/紅参エキス/タウリン  
ビタミンB2・B6/ニコチン酸アミド/カルニチン塩化物

第2類医薬品

ノンカフェイン

新ヘルビタGR 内服液

## [成分・分量]

1びん(30mL)中  
カンゾウエキス…500mg  
(原生薬換算量 2,500mg)  
コウジン乾燥エキス…30mg  
(原生薬換算量 300mg)  
タウリン……1,000mg  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)  
……………5mg  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)  
……………25mg  
ニコチン酸アミド…15mg  
カルニチン塩化物…50mg  
添加物:クエン酸水和物、炭酸水素Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料、白糖、黒砂糖、デキストリン  
<成分・分量に関する注意>  
生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

## [効能・効果]

- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体质
- 滋養強壮

押して開けてください

## 第2類医薬品

販売名:新ヘルビタGR内服液

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

### ⚠ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
長期連用しないでください。

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 高齢者。  
(3) 次の症状のある人。むくみ  
(4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けてください

偽アルドステロン症、  
ミオパチー

手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### [用法・用量]

次の1回量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15歳以上)	1びん (30mL)	1日2回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>  
定められた用法・用量を厳守してください。

#### [保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらぬ涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

#### 副作用被害救済制度

(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
電話:0120-149-931

米田薬品株式会社 大阪市浪速区塩草3丁目2-2  
お客様相談窓口 電話 06-6562-7411  
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)