

たまった疲れに効く
頑張るからだに朝夕 2錠

SESINRIKI




滋養強壮・虚弱体質

オキソアミチン末

人参エキス

L-アルギニン塩酸塩 配合

施君力U.P



1回2錠 1日2回

対象年齢:15歳以上

第2類医薬品

ビタミン含有保健薬

販売名 施君力U.P

第2類医薬品

切り取り線



開封後はチャックを閉じて保存して下さい

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。

△ 使用上の注意

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合はこの製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

次の量を朝夕食後かまずに服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	2回
15歳未満	×服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>
用法・用量を厳守して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた手で触れないで下さい。(5) 袋の中の「紙包み」は乾燥剤です。取り出したり、開けたり、食べたりしないで下さい。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持のため、6ヵ月以内に服用して下さい。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元 **協和薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造 **渡辺薬品工業株式会社**
販売元 富山県富山市水橋町555番地

【成分・分量】1日量(4錠)中

オキソアミジン末(原生薬換算量)120mg(12,000mg)、L-アルギニン塩酸塩150mg、人參乾燥エキス(原生薬換算量)72mg(720mg)、イカリソウ乾燥エキス(原生薬換算量)60mg(600mg)、カシュウ乾燥エキス(原生薬換算量)36mg(360mg)、ウルソデオキシコール酸12mg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE)20mg、ガンマ-オリザノール10mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビン(ビタミンB2)6mg、ニコチン酸アミド40mg、無水カフェイン50mg

添加物として、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、酸化チタン、黄色5号、カルナウバロウを含有します。

<成分・分量に関連する注意>
本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので心配ありません。

消費者相談窓口 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎0120-468-771
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)