



ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

### 第3類医薬品

滋養強壯保健剤  
滋養強壯、胃腸障害時の栄養補給に

# ヘパフィット



ヘパフィットは、健康な哺乳動物の新鮮な肝臓に、消化酵素を加えて消化吸収しやすくした肝臓加水分解物を主成分に、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)およびビタミンEを配合した滋養強壯保健剤です。

普段から疲れやすかったり、体力がないと  
思われている方や食べ過ぎ、飲み過ぎで胃腸  
の調子が良くないと思われている方などの滋  
養強壯、栄養補給にお役立てください。



## ⚠️ [使用上の注意]

### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	吐き気、下痢、胃部不快感

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

## [成分と作用] 1日量(6錠)中

成 分	含 量	作 用
肝臓水解物 (肝臓加水分解物)	600mg	健康な哺乳動物の新鮮な肝臓に、消化酵素を加えて消化吸収しやすくしたものです。アミノ酸を多く含み、肝臓の新陳代謝を活発にして滋養強壯に効果があります。
ジクロロ酢酸 ジイソプロピルアミン	30mg	肝臓の働きを助け、滋養強壯に効果があります。
ビタミンB <sub>2</sub> (リボフラビン)	12mg	新陳代謝を促進するビタミンです。
ビタミンE酢酸エステル	9mg	過酸化脂質の増加を防ぐとともに、末梢血管の血液循環を促進するビタミンです。

添加物として、セルロース、D-マンニトール、二酸化ケイ素、合成ケイ酸アルミニウム、カルメロースカルシウム、ヒプロメロース、白糖、タルク、酸化チタン、アラビアゴム、ポビドン、カルナウバロウ、三酸化鉄、赤色3号、青色1号、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

#### <成分に関連する注意>

本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB<sub>2</sub>（リボフラビン）によるものですので心配ありません。

## [効能・効果]

滋養強壮、胃腸障害・栄養障害・病中病後・肉体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質

## [用法・用量]

次の1回量を〔朝、昼、晩〕に水またはお湯でかまずに服用してください。


年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2 錠	3 回
15歳未満の小児	服用しないこと	

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

〈PTPシートの取り出し図〉



## [保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 錠剤の取り出し時等に肝臓水解物の特有なおいを感じる場合があります。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

#### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

**皇漢堂製薬株式会社**

(19.08.改訂)