

① ② ③ ④
⑤ ⑥ ⑦ ⑧

A502

新フジフォー®

↓ここからお出ください

第2類医薬品
30mL×3本

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
長期連用しないでください。

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)高齢者(3)むくみのある人(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人
2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肩がらドズテ	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこぼりの
ロン症、ミオ	に加えて、腕力感、筋肉痛があらわれ、徐々に
パザー	強くなる。

3.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1日量3瓶(90mL)中

ピロキシジン塩酸塩(ビタミンB6)	50mg
ニコチン酸アミド	60mg
パンテノール	45mg
タウリン	1,500mg
オロチン酸コリン	150mg
カンゾウエキス	1,050mg(原生薬換算量:4.2g)
ゴウチンキ	0.21mL(原生薬換算量:2.1mg)
ニンジンエキス	90mg(原生薬換算量:803mg)
添加剤(白糖、ハチミツ、果砂糖、水アズ、酸化Na、レグルタン酸Na、デキストリン、カラメル、安息香酸Na、パラベン、エタール、香料、グリセリン、プロピレングリコール 含有(アルコール0.5mL以下))	

【効果・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15才以上)1回1瓶(30mL)を1日3回、朝昼夕服用してください。
(15才未満の小児には服用させないでください。)

【注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)15才未満の小児には服用させないでください。(3)本剤は、まれに沈澱を生じることがありますが薬効には支障ありません。よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(服用の原形になつたり、品質が変わるため。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社富士薬品(OTC学術室)
電話(048)648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



(01)14987524112224(93)1701

発熱性消耗性疾患に
新フジフォー®
滋養強壮内服液

第2類医薬品
30mL×3本

第2類医薬品

発熱性消耗性疾患に

新フジフォー®

滋養強壮内服液

第2類医薬品

かぜなどの
発熱時の栄養ドリンク

30mL×3本

発熱性消耗性疾患に

新フジフォー®

滋養強壮内服液

ビタミンB6

ニコチン酸アミド

パンテノール

タウリン

オロチン酸コリン

カンゾウエキス

ゴウチンキ

人参エキス

製造販売元



株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

使用期限
Lot.



4 987524 112227

