

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

総合ビタミン剤

第②類医薬品

# 新ビタサプリマルチ

ビタミンは体内の代謝機能を調節し、健康維持や発育、成長などに必要な栄養素です。

新ビタサプリマルチは、12種類のビタミンに加え、日常不足しがちなカルシウム・マグネシウム配合で、虚弱体質、肉体疲労・小児の発育期・病中病後などの場合の栄養補給に適した総合ビタミン剤です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。  
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
便秘、軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

### 【効能・効果】

- 成人（15歳以上）の場合  
滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 小児（7歳以上15歳未満）の場合  
滋養強壮、虚弱体質、偏食児・小児の発育期・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

次の量を、水又は白湯で、かまずに服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	1回
小児（7歳以上15歳未満）	1錠	1回
7歳未満	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

裏面もよくお読みください。

### 【成分・分量】

2錠（成人1日量）中

レチノールパルミチン酸エステル（ビタミンA）	2000国際単位
ビスベンチアミン（ビタミンB <sub>1</sub> ）	25mg
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	6mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	25mg
シアノコバラミン（ビタミンB <sub>12</sub> ）	60 $\mu$ g
アスコルビン酸（ビタミンC）	120mg
コレカルシフェロール（ビタミンD <sub>3</sub> ）	200国際単位
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール（ビタミンE）	15mg
ニコチン酸アミド	50mg
葉酸	0.4mg
ピオチン	60 $\mu$ g
パントテン酸カルシウム*	20mg
沈降炭酸カルシウム*	120mg
無水リン酸水素カルシウム*	30mg

〔\*カルシウムとして……60mg〕

炭酸マグネシウム ……………120.2mg

〔マグネシウムとして……30mg〕

添加物として、トウモロコシ油、ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、セルロース、D-マンニトール、乳糖水和物、デキストリン、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、カルメロース、ステアリン酸Mg、マクロゴール、乳酸Ca水和物、ヒプロメロース、アラビアゴム、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

### 〈成分に関する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB<sub>2</sub>によるもので心配ありません。

### 【保管および取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4)ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐために入れてありますので、開封後はすててください。
- (5)ビンのフタの締め方が不十分な場合、湿気などの影響で品質が変わる恐れがありますので、服用のつどフタをしっかりとめてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7)箱の「開封年月日」の記入欄に、開封した日付を記入し、ビンをごの添付文書とともに箱に入れて保管してください。
- (8)一度開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内に服用してください。



### 〈お問い合わせ先〉

本製品についてのお問い合わせは、下記まで  
お願い申し上げます。

日本薬剤株式会社 電話番号 076-424-2239  
〔9：00～17：00（土、日、祝日を除く）〕

製造販売元 **日本薬剤株式会社**  
富山市東中野町一丁目1番1号

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）