

[使用上の注意]

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続

又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能] ○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

1

[用法・用量] 成人(15才以上)1回
1瓶(30mL)を1日2回服用してください。
○生薬成分の配合により、まれに沈でんを生じることがあります、効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

[成分・分量] 30mL中 チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム4mg、ピリドキシン塩酸塩15mg、ニコチン酸アミド20mg、タウリン600mg、ニンジン乾燥エキス22.5mg、五味子流エキス0.2mL、トウヒ流エキス0.25mL、カルニチン塩化物50mg(アルコール0.5mL以下)

添加物：クエン酸水和物、メタリン酸Na、白糖、D-ソルビトール、アルコール、安息香酸Na、パラベン、香料

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

発熱性消耗性疾患 病中病後の栄養補給に

ヒストミン 内服液

第3類医薬品

生薬エキス配合

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

お客様相談室 電話:0120-584-419
副作用被害救済制度 電話:0120-149-931