

〔使用上の注意〕 〔相談すること〕

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹・消化器：胃部不快感、2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔成分・分量〕 100mL中

タウリン3000mg、L-バリン45mg、L-ロイシン90mg、L-イソロイシン45mg、L-リジン塩酸塩210mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、グリシン310mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物1000mg、リボフラビン2mg、ピリドキシン塩酸塩12mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg(アルコール0.1mL以下)
添加物：白糖、スクラロース、アセスルファムK、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、キシリタンガム、プルラン、カラメル、プロピレングリコール、香料、アルコール、パニン

○本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。この心配ありません。

発売元 **小林薬品工業株式会社**

岐阜県岐阜市中區1丁目15番地
お客様相談室 電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日も除く)

製造販売元 **株式会社パナケイア製薬**
富山県高岡市中田4576番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

タウリン3000mg

アミノ酸成分2000mg

エムビタドリンク
5000
Premium

第3類医薬品

ALL WAY BASIC

販売名：エムビタドリンク5000プレミアム

〔用法・用量〕成人(15才以上)1日1回
1瓶(100mL)を服用してください。

○15才未満は服用しないでください。○用法・用量を厳守してください。

ガラス：瓶、金属：キャップ

使用期限

製造番号

〔効 能〕

○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。 OCK

