

## 効能又は効果

○滋養強壯 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中  
病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性  
疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 成分及び分量 (30mL中)

ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ浸出液  
3mL、淫羊藿浸出液1mL、チクセツニンジン浸出  
液1mL、L-リシン塩酸塩300mg、L-トレオニン  
15mg、グルクロノラクトン100mg、コンドロイチ  
ン硫酸エステルナトリウム50mg、グルコン酸カル  
シウム水和物50mg、チアミン塩化物塩酸塩  
(V.B1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリ  
ウム(V.B2)3.2mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B6)  
5mg、ニコチン酸アミド(ナイアシン)20mg、オロ  
チン酸60mg、パントテン酸ナトリウム30mg、イ  
ノシトール60mg(アルコール 0.9mL以下)  
添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、  
クエン酸Na水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、エチ  
ルパニリン、パニリン、プロピレングリコール、黄色5号、  
赤色106号を含有します

## 用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服  
用して下さい

## お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社  
電話番号 06-6352-2381  
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**ゼネル** 薬工伊都株式会社  
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1



ZENEL

30mL

**ノンカフェイン製剤**  
**ビタミン含有保健薬**

**ネオゼネル<sup>®</sup>液-B**

**生薬7種・アミノ酸・ビタミン・  
コンドロイチン・カルシウム配合**

**第2類医薬品**

発売元

**ゼネル** 薬品工業株式会社  
大阪市北区天満3丁目6番1号

 **使用上の注意**  
**相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた  
場合は副作用の可能性がある  
ので、直ちに服用を中止し、この  
製品を持って医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状が  
よくなる場合は服用を  
中止し、この製品を持って  
医師、薬剤師又は登録販売  
者に相談して下さい。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所  
に密栓して保管して下さい
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい  
(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5) 服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲み  
かけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
- (6) 本剤は生薬エキスを配合していますので、まれ  
に沈澱を生じることがありますが、薬効には変  
わりありません

製造  
番号  
使用  
期限



49339147

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ZENEL

ノンカフェイン製剤

ビタミン含有保健薬

ネオ**ゼネル**<sup>®</sup>液-B

生薬7種・アミノ酸・ビタミン・  
コンドロイチン・カルシウム配合

第2類医薬品

30mL×10

**ノンカフェイン製剤**  
**ビタミン含有保健薬**

**ネオゼネル<sup>®</sup>液-B**

**第2類医薬品**

**効能又は効果**

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**用法及び用量**

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい

**成分及び分量 (30mL中)**

- ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ } 浸出液……………3mL
- 淫羊藿浸出液……………1mL
- チクセツニンジン浸出液……………1mL
- L-リシン塩酸塩……………300mg
- L-トレオニン……………15mg
- グルクロノラクトン……………100mg
- コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………50mg
- グルコン酸カルシウム水和物……………50mg
- チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)……………10mg
- リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2)……………3.2mg
- ピリドキシン塩酸塩(V.B6)……………5mg
- ニコチン酸アミド(ナイアシン)……………20mg
- オロチン酸……………60mg
- パントテン酸ナトリウム……………30mg

イノシトール……………60mg  
アルコール……………0.9mL以下  
添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。  
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

**⚠ 使用上の注意**



**相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**保管及び取り扱い上の注意**

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい

- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい  
(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5)服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
- (6)本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません

**お問い合わせ先**

発売元 ゼネル薬品工業株式会社  
電話番号 06-6352-2381  
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元

**ゼネル薬品工業株式会社**  
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元

**ゼネル薬工伊都株式会社**  
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1



箱  
中仕切り

副作用救済制度 ☎0120-149-931

## 効能又は効果

○滋養強壯 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 成分及び分量 1日量(30mL中)

ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ浸出液3mL、淫羊藿浸出液1mL、チクセツニンジン浸出液1mL、L-リジン塩酸塩300mg、L-トレオニン15mg、グルクロノラクトン100mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム50mg、グルコン酸カルシウム水和物50mg、チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2)3.2mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B6)5mg、ニコチン酸アミド(ナイアシン)20mg、オロチン酸60mg、パントテン酸ナトリウム30mg、イノシトール60mg(アルコール0.9mL以下)

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

## 用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい

## お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社  
電話番号 06-6352-2381  
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元  
**ゼネル**薬工伊都株式会社  
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1

第2類医薬品

ZENEL

ネオゼネル<sup>®</sup>液-B

人 参 大 棗  
枸 杞 子 淫 羊 藿  
地 骨 皮 竹 節 人 参  
木 天 蓼 ア ミ ノ 酸

発売元  
**ゼネル**薬品工業株式会社  
大阪市北区天満3丁目6番1号

## ⚠ 使用上の注意

### ■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5)服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲みかけのものをもどす等)注意して下さい
- (6)本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません

ZENEL

開封口

480mL×2



ビタミン含有保健薬

ネオゼネル®液-B

第2類医薬品

生薬7種  
アミノ酸  
ビタミン

コンドロイチン  
カルシウム  
配合

製造販売元



ゼネル薬工伊都株式会社

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1

直射日光を避け、なるべく  
湿気の少ない、涼しい所  
に密栓して保管して下さい。  
※瓶の口、計量容器は  
常に清潔にして下さい。

第2類医薬品

ビタミン含有保健薬

ネオゼネル®液-B

効能又は効果

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、  
1回30mLを服用して下さい  
\*計量容器を添付します

成分及び分量(30mL中)

ニンジン 枸杞子 地骨皮 } 浸出液  
木天蓼・タイウ }  
淫羊藿浸出液 ..... 3mL  
チクセツニンジン浸出液 ..... 1mL  
L-リシン塩酸塩 ..... 300mg  
L-トレオニン ..... 15mg  
グルクロノラクトン ..... 100mg  
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム ..... 50mg  
グルコン酸カルシウム水和物 ..... 50mg  
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1) ..... 10mg  
リポフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2) ..... 3.2mg  
ピリドキシン塩酸塩(V.B6) ..... 5mg  
ニコチン酸アミド(ナイアシン) ..... 20mg  
オロチン酸 ..... 60mg  
パントテン酸ナトリウム ..... 30mg  
イノシトール ..... 60mg  
アルコール ..... 0.9mL以下  
添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、バラベン、香料、エチルパラリン、パリエリン、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

製造番号

使用期限

第2類医薬品

ビタミン含有保健薬

ネオゼネル®液-B

ZENEL

480mL×2



ビタミン含有保健薬

ネオゼネル®液-B

第2類医薬品

人 参  
枸杞子  
地骨皮  
木天蓼  
大 棗  
淫羊藿  
竹節人參  
配合

発売元



ゼネル薬品工業株式会社

大阪市北区天満3丁目6番1号



第2類医薬品

ビタミン含有保健薬

ネオゼネル®液-B

服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。  
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

使用上の注意

相談すること

1) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2) しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5) 服用期間中瓶の中の液をよこさないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
- (6) 本剤は生薬エキスを配合していますが、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません

お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社  
電話番号 06-6352-2381  
受付時間 9時から17時まで  
(土、日、祝日を除く)



4 962720 300005

副作用救済制度 ☎0120-149-931

