

肝臓加水分解物 600mg 配合

糖類ゼロ

コンクレバンキユア

なかなか疲れがとれない人に

30mL 第3類医薬品

服用に際し、表示事項を必ず読んでください。

使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分分量 1本(30mL)中

肝臓加水分解物	600mg	L-バリン	94mg
チアミン硝酸物	10mg	L-ロイシン	106mg
リボフラビン	6mg	L-イソロイシン	94mg
ピリドキシン塩酸塩	6mg		

添加物:エリスリトール、アセスルファムカリウム、スクラロース、タウマチン、pH調節剤、バラベン、プロヒレングリコール、カラメル、香料
(成分分量に関連する注意)尿を黄変させることがあります。

用法用量 成人(15才以上) 1回1本(30mL)を1日1回服用してください。小児(15才未満)には服用させないでください。

効能効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

保管および取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手のとどかない所に保管してください。3.他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。4.まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。5.表示の使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度 ガラスビン
0120-149-931 全薬キヤップ

製造販売元
健創製薬株式会社
東京都中央区日本橋小舟町9-17
電話: 03-3527-3690

TS2006

製造番号◆使用期限(年・月)

