

ビタミン含有保健薬

△ 使用上の注意

★ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕 1瓶(50mL)中

海狗腎チンキ	100μL
(カイクジン20mgに相当)	
鹿茸チンキ	35μL
(ロクジョウ10mgに相当)	
反鼻液エキス	50μL
(ハンビ50mgに相当)	
人參乾燥エキス	40mg
(ニンジン600mgに相当)	
イカリ草エキス	10mg
(インヨウカク100mgに相当)	
ローヤルゼリー	50mg
タウリン	500mg
イノシトール	50mg
チアミン硝酸塩	5mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg
無水カフェイン	50mg
ニコチン酸アミド	20mg
(アルコール0.3mL以下)	

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、酒石酸、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、シロウキョウチンキ、プロピレングリコール、安息香酸、パラベン、香料、エタノール、ベンジルアルコール、グリセリン、パロリン

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患、妊娠授乳期などの場合の栄養補給

おくり相談室 0748-88-4181
9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

第2類医薬品

50mL

肉体疲労時の栄養補給に

アコゲン[®]W

鹿 茸

抽出エキス配合

人 蔘

製造販売元

D 大昭製薬株式会社

DAISHO

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場1-10

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

行登録商標

〔用法・用量〕 020106-4

大人1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

●定められた用法・用量を厳守してください。

【その他の注意】

本剤は生薬エキスを配合しておりますので、濁りや沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ガラス：瓶
金 属：キャップ

使用
期限

製造
番号

