

成分・分量 1日量1本(100mL)中
タウリン500mg、ローヤルゼリー100mg、
ニンジンエキスを55mg(ニンジン610mg
に相当)、オウギエキスを100mg(オウギ
600mgに相当)、チアミン硝酸塩10mg、
リボフラビンリン酸エステルナトリウム3mg、
ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸
アミド20mg、無水カフェイン50mg
添加物:白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、
安息香酸Na、カラメル、クエン酸水和物、dl-
リンゴ酸、クエン酸Na水和物、プロピレノ
グリコール、エタノール、香料
〔アルコール0.7mL以下〕

●本剤に配合されているリボフラビン
リン酸エステルナトリウムにより、
尿が黄色になることがある。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・
胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性
疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)
を服用する。●用法及び用量を厳守
すること。●本剤は、まれに沈殿を
生じることがある。よく振って服用
すること。

金属:キャップ ガラス:瓶

〈お客様相談室〉06-6203-5151
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50



使用上の注意

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)加温、冷凍はさけること。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

使用期限

製造番号

AL06



第3類医薬品