

# ツムラの 滋養強壯剤

ハイクタンD

牛黄・鹿茸・人参配合



第3類医薬品



第3類医薬品

〔販売名〕ハイクタンD

⚠〔使用上の注意〕

☎〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくなる  
ない場合は服用を中止し、こ  
の製品を持って医師、薬剤師ま  
たは登録販売者に相談してく  
ださい。

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・  
病後の体力低下・胃腸障害・栄  
養障害・発熱性消耗性疾患・妊  
娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

次の量を、1日1回服用してください。

年齢	1回量
成人 (15歳以上)	1瓶(50mL)
15歳未満	服用しない てください

・用法・用量を厳守してください。

〔保管および取扱い上の注意〕

- 1.直射日光の当たらない湿気の少  
ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管し  
てください。
- 3.誤用をさげ、品質を保持するため、  
他の容器に入れかえないください。
- 4.使用期限を過ぎた製品は、服用  
しないでください。
- 5.本剤は、生薬成分を配合しており  
ますので、沈殿または浮遊を生じ  
ることがありますが、効能・効果に  
は変わりありません。よく振って  
服用してください。


〔成分・分量〕(1瓶50mL中)

ロクジョウチンキ……………0.10mL  
(原生薬換算量:28mg)  
ゴオウチンキ……………0.50mL  
(原生薬換算量:5mg)  
ニンジン流エキス……………0.60mL  
(原生薬換算量:600mg)  
L-リシン塩酸塩……………100mg  
グルクロノラクトン……………50mg  
ピリドキシン塩酸塩……………5mg  
リボフラビン……………2mg  
ニコチン酸アミド……………20mg  
無水カフェイン……………50mg

添加物として日局安息香酸ナ  
トリウム、日局精製水、日局  
白糖、日局ハチミツ、日局パ  
ラオキシ安息香酸ブチル、日  
局プロピレングリコール、エ  
タノール、クエン酸、シリコ  
ーン樹脂、D-ソルビトール  
液、バニリン、ポリオキシエ  
チレン硬化ヒマシ油60、dl-  
リンゴ酸、香料を含有します。  
(アルコール含有0.6mL以下)

副作用被害救済制度  
電話0120-149-931

発売元

 株式会社ツムラ  
東京都港区赤坂2-17-11  
〒107-8521

お客様相談窓口

電話 0120-329-930  
<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元

日新薬品工業株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町田塔野80-1

〔販売名〕ハイクタンD

△〔使用上の注意〕

■〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

次の量を、1日1回服用してください。

年齢	1回量
成人 (15歳以上)	1瓶(50mL)
15歳未満	服用しないでください

• 用法・用量を厳守してください。

発売元

 株式会社ツムラ  
東京都港区赤坂2-17-11  
〒107-8521

お客様相談窓口  
電話 0120-329-930  
<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元 日新薬品工業株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

製造  
番号  
使用  
期限

# ツムラの 滋養強壯剤

ハイクタンD

牛黄・鹿茸・人參配合

# 人參 鹿茸 牛黄



50mL



株式会社ツムラ

第3類医薬品

〔成分・分量〕(1瓶50mL中)

ロクジョウチンキ……………0.10mL  
(原生薬換算量:28mg)  
ゴオウチンキ……………0.50mL  
(原生薬換算量:5mg)  
ニンジン流エキス……………0.60mL  
(原生薬換算量:600mg)  
L-リシン塩酸塩……………100mg  
グルクロノラクトン……………50mg  
ピリドキシン塩酸塩……………5mg  
リボフラビン……………2mg  
ニコチン酸アミド……………20mg  
無水カフェイン……………50mg  
(アルコール含有0.6mL以下)

〔保管および取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
5. 本剤は、生薬成分を配合しておりますので、沈殿または浮遊を生じることがありますが、効能・効果には変わりありません。よく振って服用してください。