

食欲不振・小児の発育期

発熱性消耗性疾患時の栄養補給に

小児用スパイブリン®内服液

SUPER



タウリン・ゴオウ・薬用人参配合

第3類医薬品

発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

お客様相談室 03-3370-7174(代表)

食欲不振・小児の発育期 発熱性消耗性疾患時の栄養補給

成分・分量 1本(20mL)中

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| タウリン | 250mg |
| ニンジンエキス(原生薬換算133.3mg) | 20mg |
| ゴオウ浸出液(原生薬換算1mg) | 100mg |
| チアミン塩化物塩酸塩(V.B ₁) | 0.5mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B ₂) | 0.7mg |
| ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆) | 2mg |
| シアノコバラミン(V.B ₁₂) | 0.5 μ g |
| パントテン酸カルシウム | 5mg |

添加物としてクエン酸、白糖、コハク酸2Na、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリンを含有する。

用法・用量

8才以上15才未満1回1本(20mL)、1日3回食後に服用してください。

[注意]小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、小児の発育期・偏食児・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

小児用スパズリル[®]内服液

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感、下痢
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

取扱い上の注意

1. 小児の手のとどかない所に保管してください。
 2. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- まれに沈殿(生薬による)を生じることがありますが、薬効には変わりありません。
ビタミンB₂が配合されていますので、尿が黄色くなることがあります。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)



製造販売元

福井製薬株式会社

大阪市城東区今福東3丁目1番26号

10303121