

病後の体力低下・食欲不振・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

小児用ブリル[®]内服液



第3類医薬品

タウリン・ゴオウ・薬用人参 配合

第3類医薬品

虚弱体質、滋養強壮に

開封口

小児用ブリル®内服液

成分・分量 1本(20mL)中

タウリン	250mg
ニンジンエキス(原生葉換算133.3mg)	20mg
ゴオウ抽出液(原生葉換算0.85mg)	4mL
チアミン塩化物塩酸塩(V.B ₁)	0.5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B ₂)	0.5mg
添加物としてクエン酸、白糖、安息香酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリンを含有する。	

用法・用量

3才以上15才未満1回1本(20mL)、1日3回食後に服用してください。

[注意]幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、幼小児の発育期・偏食児・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<https://www.nippo-yakuhin.jp/>

お客様相談室 03-3370-7174(代表)

使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
皮膚:発疹／消化器:胃部不快感、下痢
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

取扱い上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

まれに沈殿(生葉による)を生じることがありますが、薬効には変わりありません。
ビタミンB₂が配合されていますので、尿が黄色くなることがあります。

副作用被害救済制度の問合せ先
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)



製造販売元

福井製薬株式会社

大阪市城東区今福東3丁目1番26号 11501231