

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

発育期、妊娠・授乳期
老年期まで幅広い世代に
カルシウム主薬製剤

第2類医薬品

カルシウムチュアブル錠N

カルシウムは、骨や歯の構成成分として重要な栄養成分です。不足すると、神経や筋肉の興奮性が高まり、イライラ感や疲労感の要因にもなるため、発育成長や健康維持に、また、妊娠・授乳期や老年期に必要な量を充分補給することが大切です。

カルシウムチュアブル錠Nは2錠で610mgのカルシウムが補給できるほか、カルシウムの吸収を促すビタミンD₃やマグネシウムを配合した、水なしで服用できるヨーグルト風味のチュアブル錠です。

⚠ 使用上の注意

👤 相談すること

1. 次の人は服用しないこと
フェニルケトン尿症の人(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含んでいます。)
 2. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
 3. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|-------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、腹部不快感 |
4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、下痢
 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



用法・用量

次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	2錠	1日1回 必ずかみくだくか口中で溶かして服用してください。
7才～14才	1錠	
7才未満	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

裏面もお読みください

次の場合のカルシウムの補給：妊娠・授乳期、老年期、発育期

成分・分量 2錠中

成 分 名	分 量	作 用
沈降炭酸カルシウム (カルシウムとして)	1525mg 610mg)	骨や歯の形成に必要なミネラルです。
炭酸マグネシウム (マグネシウムとして)	118.4mg 30mg)	骨や歯の形成に必要なほか、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つことにも必要なミネラルです。
コレカルシフェロール (ビタミンD ₃)	400 I.U.	腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助けるビタミンです。
タウリン	150mg	全身のあらゆる所に存在し、体の正常な機能維持に大切な含硫アミノ酸の一種です。

添加物：中鎖脂肪酸トリグリセリド、ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、エリスリトール、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、CMC、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、エチルバニリン、バニリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓し、箱に入れて保管してください。キャップの閉め方が不十分な場合、湿気等の影響で薬が変質することがありますので、使用のつどキャップをきちんと閉めてください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 開封後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないでください。
- (7) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。これをビンに出し入れますと異物混入の原因になることがあります。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電 話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地