



2012年9月 記載要領変更に伴う改訂

**第2類
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



カルシウム主薬製剤 カルカルシ[®]

カルカルシンは…

- 水なしでかんでのむか、口の中で溶かしながらのめるヨーグルト風味のチュアブル錠です。
- 育ち盛りのお子様や、妊娠授乳婦の方の骨や歯を丈夫にする働きがあります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
便秘、下痢
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効 能】

- 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質
- 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱(せいじゃく)防止

【用法・用量】

下記の1回服用量を食後にかみくだくか、口の中で溶かしながら服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	3回
11~14才	2錠	
5~10才	1錠	
5才未満	服用しないでください	

★裏面につづく

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量と働き〕9錠中

成分	分量	働き
沈降炭酸カルシウム	1,415mg	骨や歯の形成維持に効果をあらわします。
クエン酸カルシウム	100mg	
グルコン酸カルシウム水和物	150mg	
(総カルシウムとして601.1mg)		
ビタミンD ₃	400I.U.	カルシウムの吸収を助け、骨の発育を促進します。

※I.U. は国際単位。

添加物として、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、白糖、ラウリン酸ソルビタン、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、D-マンニトール、乳糖、dl-リンゴ酸、クエン酸、アセスルファムK、ステアリン酸Mg、香料(デンプン部分加水分解物、エチルバニリン、バニリン、アルコールを含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



カルシウムは、牛乳や小魚に多く含まれるミネラルです。骨や歯を丈夫に保つので、育ち盛りのお子様や妊娠授乳婦の方にとっては大切な成分です。

また、ビタミンDは、魚の油の中に多く含まれていますが、日光に当たると人間の体内でも作ることができます。カルシウムの吸収を助ける働きがあることでも知られているビタミンです。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号