

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

カタセマグ[®]

—カルシウム剤—

第2類医薬品

(フィルムコーティング有核錠)

カタセマグは、主成分であるカルシウム(沈降炭酸カルシウム)に、マグネシウム(炭酸マグネシウム)・鉄(フマル酸第一鉄)・ビタミンD₃(コレカルシフェロール)を配合したカルシウム剤です。

マグネシウムは、カルシウムとともに骨を構成しているミネラルであり、カルシウムとマグネシウムが協調することにより、骨の質を高めているといわれています。

【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 次の医薬品を服用している人。
マグネシウムを含有する医薬品
- (3) 次の健康食品を摂取している人。
マグネシウムを含有する健康食品

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、下痢

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

○次の場合の骨歯の発育促進：

虚弱体質、腺病質*。

○妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止。

[※腺病質：滲出性あるいはリンパ体質(アレルギー、湿疹などになりやすい体质)の小児や無力体質(体力のない体质)、神經質のことをいいます。]

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	4錠 0000	3回
9才以上 15才未満	2錠 00	
9才未満		服用しないこと

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は水又はぬるま湯で、服用してください。

【成 分】 (12錠中)


成 分		分量	解 説
外 皮	沈降碳酸カルシウム Precipitated Calcium Carbonate	1,500 mg	カルシウムとして600mg。カルシウムは、骨を構成する主成分であり、骨や歯の形成に必要なミネラルです。
	炭酸マグネシウム Magnesium Carbonate	1,184 mg	マグネシウムとして300mg。マグネシウムは、骨の代謝回転を調節する働きがあり、骨や歯の形成に必要なミネラルです。
	タウリン Taurine	150 mg	多くの動物体内に存在する含硫アミノ酸の一種です。
	フマル酸第一鉄 Ferrous Fumarate	30 mg	鉄として10mg。鉄は、カルシウム、マグネシウムの代謝に関与し、骨や歯の形成に必要なミネラルです。
内 核	コレカルシフェロール Cholecalciferol	400 I.U.	ビタミンD ₃ として400I.U.。ビタミンD ₃ は、腸管でカルシウムの吸収を促進し、骨、歯へのカルシウム沈着(供給)を助けるビタミンです。
	L-リシン塩酸塩 L-Lysine Hydrochloride	120 mg	必須アミノ酸の一つ。欠乏症状として歯牙発育不全が知られています。
	リボフラビン Riboflavin	5 mg	ビタミンB ₂ として5mg。黄色いビタミンです。

添加物としてゼラチン、タルク、デンプン部分加水分解物、バニリン、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、ラウリノ酸ソルビタン、香料、グリセリン脂肪酸エステル、クロスカルメロースNa、硬化油、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セルロース、中鎖脂肪酸トリグリセリド、白糖、ヒプロメロース、マクロゴールを含有します。

〈成分に関する注意〉

- (1)本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB₂)によるもので、ご心配ありません。
- (2)配合されているフマル酸第一鉄により、便が黒くなることがあります。

カタセマグの断面



- 配合成分の安定性にすぐれた有核錠です。
- 内核の黄色は有効成分リボフラビン(ビタミンB₂)によるものです。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります。)
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、錠剤の破損防止のために入れてあります。開封後、詰め物はすべてください。(開封後に詰め物を出し入れすると、湿気やホコリなどが入り込み、品質が低下する原因になる。)
- (6)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

○外皮に黒っぽい斑点が見られることがあります。これは有効成分フマル酸第一鉄によるもので、ご心配ありません。

問い合わせ先

- お買い求めのお店
- 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15