

# 水溶性カルシウム剤

# ツーリック<sup>®</sup>Ca錠

Ca、VB<sub>1</sub>誘導体、VB<sub>6</sub>配合

## ○ツーリック Ca の特徴

※カルシウムは、丈夫な骨や歯の主成分として重要です。

※カルシウムの補給で血液中のカルシウム量が増え、骨のカルシウム分が血液中に溶け出すのを防ぎ骨を丈夫にします。

※水溶性カルシウムは血液に溶けやすく、全身をめぐり、細胞内の体液や血液を常にアルカリ性に保つ働きがあります。

※発育成長期のお子様の骨や歯の形成、又は妊娠、授乳期の人には、胎児や母体の組織の増残を助けるためにより多くのカルシウムを必要とします。

※カルシウムの補給に用いる他、低カルシウムの血症によるテタニー症状(筋肉のつり、硬直、しびれ)に適応します。

※骨が弱くなる骨粗しょう症の治療にも使われます。

※ツーリック Ca 錠は、発育期や、妊娠・授乳期に不足しがちな刺激の少ない吸収のよいグルコン酸 Ca の他、ビタミンB<sub>1</sub>誘導体やビタミンB<sub>6</sub>を配合したカルシウム剤で、吸収性に優れ、お子様からお年寄りの方まで安心してご利用いただけます。

## 〔有効成分・分量〕 (18錠中)

グルコ酸カルシウム水和物	2,200 mg
チアミンジスルフィド (VB <sub>1</sub> 誘導体)	15 mg
ピリドキシン塩酸塩 (VB <sub>6</sub> )	15 mg
添加物として、キシリトール、乳糖水和物、結晶セルロース、パレイショデンポン、HPC、CMC-Ca、ステマリン酸 Mg、タルクを含有します。	

## 〔効能・効果〕

1. 次の場合の骨歯の発育促進: 虚弱体質、腺病質
2. 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止

## 〔用法・用量〕

15才以上	1回6錠宛
11才以上～15才未満	1回4錠宛
7才以上～11才未満	1回3錠宛
5才以上～7才未満	1回2錠宛
1日3回、食後に服用して下さい。	

## 〔使用上のご注意〕

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
便秘。
3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

### 服用に際しての注意

1. 定められた用法・用量をお守り下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 保管及び取扱い上のご注意

1. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。（ビタミンは直射日光にあてると分解し易い。）
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。  
（誤用の原因になったり品質が変わる）

製造販売元



富山薬品株式会社

富山市四方西岩瀬石瀬 1 7 5