

服用に際しては、表示事項をよく読むこと。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛、胃痛、胃部不快感、腹部膨満感、食欲不振、胸やけ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕 次の場合のカルシウムの補給：
妊娠・授乳期、発育期、老年期

〔用法・用量〕 成人（15才以上）1回30mL、
1日1～2回服用する。15才未満は服用しないこと。

バイランは、ゼリア新薬工業（株）の登録商標です。

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3527-3690

受付9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

バイラン[®] CaII

品質保持の点から、開栓後速やかに
服用すること。

開栓後要冷蔵

〔成分分量〕

1日量（60mL）中
グルコン酸カルシウム水和物……………2400mg
乳酸カルシウム水和物……………3000mg
クエン酸鉄アンモニウム……………30mg
L-リシン塩酸塩……………60mg
（カルシウムイオンとして600mg、鉄イオンとして5mgを含有。）

添加物：D-ソルビトール、粉末還元麦芽糖水アメ、DL-リンゴ酸、グリチルリチン酸二カリウム、安息香酸、プロピレングリコール、pH調節剤2成分、香料

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品

500mL

ゼリア新薬

開 栓 年 月 日

開栓時に記入してください

販売名：バイランCaII

第2類医薬品

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。)
- (4) 開栓後は冷蔵庫に立てて保管すること。
- (5) 服用のつどフタをよくしめること。
- (6) 雑菌などの汚染のおそれがあるので、ビンの口に直接口をつけて服用したり、計量コップに入れた薬液をビンにもどさないこと。
- (7) 開栓後、味、臭いに変化があり異常を感じた場合は直ちに服用を中止すること。
- (8) ビンの口、計量コップは常に清潔に保つこと。
- (9) ビンの口、キャップに白い結晶が現れたり、白い沈殿が生じることがありますが、これは内容成分のカルシウムの結晶です。
- (10) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製造番号

使用期限（年・月）



キャップ：PP 中栓：PP
フィルム：PET 計量コップ：PS

ガラス：ビン

J24