

ボレイ末を主薬としたカルシウム製剤

新 ササカル

第3類医薬品

(顆粒)

『新ササカル(顆粒)の特長』

カルシウムは私たちの骨や歯をつくっている重要な構成成分です。また、そればかりではなく血液にとけ込んで全身に運ばれ、筋肉の働きや神経機能の調節、更に全ての細胞の働きに重要な役目を果たしています。新ササカル(顆粒)はボレイ末とグルコン酸カルシウムに乳酸カルシウムを加えて一日量で約600mgのカルシウムが摂れるようにしてあります。ボレイ末は、昔から良質なカルシウム源として利用されているばかりでなく、漢方薬原料の古典である「神農本草経」にも収載されている昔から重要な原料の一つでもあります。グルコン酸カルシウムと乳酸カルシウムは胃液の中での溶解性が高く吸収の良いカルシウムです。また、新ササカル(顆粒)はカルシウムの補給と栄養・吸収のバランスを考えてビタミンB群とカルシウムの吸収を良くするビタミンDの前駆体であるエルゴステリンや多種類のアミノ酸を豊富に含有している乾燥酵母を配合してあります。成長期のお子さんから若い女性、或いは妊産婦の方、そしてお年寄りまで、ストレス社会に生きるすべての方を対象とした大変にのみやすい吸収のすぐれたカルシウム剤です。



虚弱体質



育ち盛り



妊婦・授乳期

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
便秘
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

- a) 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質。
(腺病質とは、貧血などになりやすい虚弱・無力体質を指します。)
- b) 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止。

用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をご覧ください。

用法・用量

次の量を食間に温湯又は水にて服用してください。

(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15才以上	1包(1.5g)	3 回
15才未満 7才以上	2/3包	
7才未満 5才以上	1/2包	

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

3包(成人の1日服用量)中

成 分	分 量	はたらき
ボレイ末	1.5g (カルシウムとして470mg)	体内へカルシウム補給
グルコン酸カルシウム水和物	0.8g (カルシウムとして70mg)	体内へカルシウム補給
乳酸カルシウム水和物	0.5g (カルシウムとして60mg)	体内へカルシウム補給
乾燥酵母	0.3g	ビタミンB群やアミノ酸等の栄養補給とカルシウムの吸収を高める。

添加物としてデンプン、乳糖水和物、銅クロロフィリンNa、香料を含有します。

〔注 意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室

0120-432-894

[月～金曜日/10:00～12:00 13:00～17:00 (祝日を除く)]

製造販売元：株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193