

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。



第2類医薬品

# カルシウム錠D<sub>3</sub>プラス

## カルシウム主薬製剤

### 特徴

- 1日12錠(15歳以上)で、カルシウム601mgが摂取できます。
- カルシウムの吸収を促進するビタミンD<sub>3</sub>とタウリンを配合しています。
- カルシウムとともに不足しがちなミネラルであるマグネシウムも同時に摂取できます。



### 使用上の注意

#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
便秘
3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

- 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質
- 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止

腺病質とは――

貧血などになりやすい虚弱・無力体質をさします。

### 用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	4錠 〇〇〇〇	1日3回
8歳～14歳	2錠 〇〇	
5歳～7歳	1錠 〇	
5歳未満	服用しないこと	

#### 〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(12錠)中

成 分	含 量	は た ら き
乳酸カルシウム水和物	720 mg	3種類のカルシウム成分にカルシウムとして601mgが含まれます。骨歯の主成分であり、骨の維持・形成に重要なカルシウムを補給します。
沈降炭酸カルシウム	1,200 mg	
グルコン酸カルシウム 水和物	300 mg	
タウリン	170 mg	カルシウムの吸収を助けます。
炭酸マグネシウム	118.4 mg (マグネシウム として30mg)	骨に大切なマグネシウムを補給。カルシウムと一緒にになって強い骨を作ります。
コレカルシフェロール (ビタミン D <sub>3</sub> )	400 I.U.	カルシウムの吸収を助け、骨の発育を促進します。

添加物として、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、還元麦芽糖水アメ、D-マンニトール、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 服用のつどキャップをよくしめてください。
- (5) ビンの中の詰め物は、キャップをあけた後は捨ててください。(詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものです。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎ 0238(46)2013  
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

製造販売者 協同薬品工業株式会社  
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930