

カルシウム剤 速溶錠
商品名：トキメキサンCA錠

第2類医薬品

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化するおそれがあります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、開封後は捨ててください。
- (6) 水分が錠剤につくと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れたものを容器に戻さないでください。
- (7) 開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (8) 錠剤表面の微褐色球形斑点は成分のビタミンD₃によるものです。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

お問い合わせ



九州アスリート製薬

チヨウコン ハート

0120-756-810

製造販売元 ワダカルシウム製薬株式会社

大阪府大阪市都島区東野田町 4-1-17

販売者 株式会社 エモテント「九州アスリート製薬」

福岡県福岡市博多区中洲 5-3-8

私の未来に

老年期、発育期のための有効成分配合

九州アスリート製薬の

トキメキサン

CA錠

30日分120錠

カルシウム・マグネシウム・
ビタミンD₃配合

第2類
医薬品

有効成分

沈降炭酸カルシウム(カルシウム)

炭酸マグネシウム(マグネシウム)

コレカルシフェロール(ビタミンD₃)



九州アスリート製薬



4 580496 391104



ご使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。



⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】4錠(成人1日服用量)中

成分	分量(4錠中)
沈降炭酸カルシウム	1,525mg(カルシウムとして610mg)
炭酸マグネシウム	118.4mg(マグネシウムとして30mg)
コレカルシフェロール (ビタミンD ₃)	10μg(400I.U.)

添加物として中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、D-マンニトール、クロスボビドン、ステアリン酸カルシウム、スクラロース、アセスルファムカリウム、香料を含有する。

【効能・効果】

次の場合のカルシウムの補給：妊娠・授乳期、発育期、老年期

【用法・用量】

次の量を1日1回かむか、口中で溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	1回
7歳以上15歳未満	2錠	1回
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

使用期限

製造番号