

C014

開封口

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- 服用の都度ビン内のキャップをしっかりと開けてください。(吸湿すると品質が変わることがあります)
- 錠剤を濡れた手で扱わないでください。(糖衣錠がはげたり変色の原因となります)
- 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヵ月以内の服用を目安にしてください。
- ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は、乾燥剤です。服用しないでください。
- 本剤はL-システイン、DL-メチオニンを配合しておりますので、多少特異なおいがあることもありますが、効果に変わりはありません。
- ビンの中の詰め物は、開封後に捨ててください。詰め物を捨てたのちは、落下等の衝撃で錠剤破損(糖衣の欠け)が生じることがありますので、取り扱いには注意してください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 **株式会社富山常備薬**
 医薬品相談窓口
☎0120-432-093
 受付時間 9:00~18:00(年中無休)

発売元 **株式会社富山常備薬**
 富山県富山市丸の内1丁目8番17号

製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**
 奈良県大和高田市旭南町2番25号

ビンの中の詰め物は錠剤の破損防止のためです。開封後に捨ててください。

販売名: ザ・リンクフィル 第3類医薬品

成分・分量 1日量(9錠)中

ローヤルゼリー...50mg
 ビタミンE散(50%)...50mg
 アスコルビン酸(ビタミンC)...180mg
 ニコチン酸アミド...30mg
 パントテン酸カルシウム...15mg
 L-システイン...160mg
 DL-メチオニン...100mg
 チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)...10mg
 リボフラビン(ビタミンB2)...10mg
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)...5mg
 シアノコバラミン(ビタミンB12)...5µg
 カルニチン塩化物...50mg
 安息香酸ナトリウムカフェイン...100mg
 グリチルリチン酸-アンモニウム...10mg
 ハンゲ末...100mg、シヤクヤク末...200mg、ソウジュツ末...150mg、ブクリョウ末...150mg、センキュウ末...100mg、タクシヤ末...100mg、トウキ末...100mg、ニンジン末...100mg

添加物として無水ケイ酸、バレイシヨデンブ、ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロス、白糖、タルク、酸化チタン、アラビアゴム、ホビドン、黄色5号及びカルナワバロウを含有する。

【成分・分量に関する注意】

- 本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB2)によるもので心配はありません。
- アスコルビン酸(ビタミンC)の服用により、尿および大便の検査値に影響を及ぼすことがありますので、尿および大便の検査をうける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせしてください。

用法・用量

下記の1回量を食後に水またはぬるま湯で、かまずに服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 3錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

【用法・用量に関する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。

キミエホワイトシリーズ 第3類医薬品

The Wrinkfill
ザ・リンクフィル

富山常備薬

キミエホワイトシリーズ 第3類医薬品

小じわ・しみに飲んで効く医薬品

The Wrinkfill
ザ・リンクフィル

31日分 279錠

富山常備薬

開封年月日

開封時に記入してください

服用前に、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

しみ、そばかす、にきび、はだあれ、小じわ、肩こり、腰痛、神経痛、のぼせ、目まい、みみなり、冷え症、手足の冷感、腰部冷感、妊娠授乳期・病中病後・肉体疲労・食欲不振などの場合の栄養補給

AS4036210921

使用期限 製造番号

