

【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人（15歳以上）
1日1回1瓶（100mL）を服用し
て下さい。

●用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】1日量（100mL）中
チアミン硝酸塩10mg・リボフラビンリン
酸エステルナトリウム5mg・ピリドキ
シン塩酸塩5mg・ニコチン酸アミド
40mg・無水カフェイン50mg・L-リシ
ン塩酸塩100mg・タウリン3000mg・
ローヤルゼリーチンキ50mg（原生薬
換算量50mg）・ジャショウシエキス
20mg（原生薬換算量200mg）

添加物として、クエン酸・DL-リンゴ酸・
白糖・ブドウ糖・D-ソルビトール・ハチ
ミツ・安息香酸Na・パラベン・香料を含
有します。（アルコール0.2mL以下）

●本剤の服用により、尿が黄色くなる
ことがあります。これは本剤中のリボ
フラビンリン酸エステルナトリウムによ
るもので心配ありません。

副作用救済制度

電話 0120-149-931



協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号
フリーダイヤル 0120-468771

第3類医薬品

ASTOCAL
3000

タウリン3000mg
ローヤルゼリー50mg配合

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給

アストカル® 3000

【使用上の注意】

〔相談すること〕

次の場合は、服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
して下さい。

●しばらく服用しても症状がよくなりな
い場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない
涼しい所に保管して下
さい。(2) 小児の手の届
かない所に保管して下
さい。(3) 使用期限を過ぎ
た製品は服用しないで下
さい。(4) 本剤は生薬を
配合していますので、ま
れに沈殿又は浮遊を生じ
ることがありますが、薬効
には変わりありませんので、
よく振ってから服用して
下さい。