

第3類医薬品

AMINOWHITE
アミノホワイト

EGAO 180錠 (30日分)

押して開ける

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

この製品についてのお問い合わせは、下記にお願ひ申し上げます。

株式会社 えがお 電話: 0120-241-241

HP: <http://www.241241.jp>

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(株)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkoukyaku.com/pmda/ise.htm>

電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 中村薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町丹生谷31-32

販売先

株式会社 えがお

熊本県熊本市東区東町4-10-1

A1

製造番号

使用期限

2014年10月 第3類医薬品

特許 06 特許 07 特許 08

●容器の中の詰め物は本剤の増量防止用です。開封時に捨ててください。ただし、乾燥剤はそのまま容器に入れた状態で保管してください。

成分・分量

6錠/成人1日量中

アスコルビン酸カルシウム	363mg
アスコルビン酸セスキカルシウム	24mg
パントテン酸カルシウム	240mg
L-システイン	240mg

添加物として、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、タルク、アラビガム、酸化チタン、カルナウバワックスを含有する。

成分・分量に関連する注意

ビタミンCを含有する製剤は、尿及び大便の糖酸塩に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師に告知してください。

効能・効果

●しみ・そばかす、日焼けなどの色素沈着 ●全身倦怠 ●二日酔い ●にきび、酒疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

用法・用量

次の量で1日3回、水又は白湯にて服用してください。			
年齢	1回服用量	1日服用回数	
成人(15歳以上)	2錠	3回	
7歳以上15歳未満	1錠	3回	
7歳未満	服用しないこと		

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法、用量を守ってください。
- 7歳以上15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監視のもとに服用させてください。
- 本剤がどのくらいかかるとのことのないよう、よく注意してください。

EGAO 顔・背中・腕など

日焼け・しみ
そばかすなどの
色素沈着症に
飲んで効果がでる医薬品

L-システイン
240mg

パントテン酸
カルシウム

アスコルビン酸
カルシウム
(ビタミンC)

第3類医薬品

からだの中から
アミノホワイト
健康な肌へ

180錠

●本剤にぬれた手で触れないでください。又、手についた薬剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。

第3類医薬品

L-システイン特許

アミノホワイト

本剤はL-システインを主剤とし、これにビタミンC、パントテン酸カルシウムを配合したL-システイン製剤です。L-システインは、しみ・そばかすの原因となる過剰なメラニン色素の生成をおさえ、ビタミンCと協力して、しみ・そばかす、日焼けなどの色素沈着を改善します。又、代謝酵素の働きを助け、全身倦怠、二日酔いにも効果あらわします。

服用に際して、下記の説明文書を必ずお読みください。又、必要に応じて読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

△相談すること
1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気、嘔吐、胃痛

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。なお、服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。