

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

説明文書改訂年月
2012年7月
(記載要領変更に伴う改訂)

©

しみ・そばかす・日焼けによる色素沈着に

パンピンチオC

第3類医薬品

L-システイン製剤

パンピンチオCは、アミノ酸の一種であるL-システイン及びしみやそばかすの原因となるメラニンの生成を抑制するアスコルビン酸（ビタミンC）にパントテン酸カルシウムを配合した製剤で、しみ・そばかす・にきび・二日酔・全身倦怠に優れた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 1 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛

- 2 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
下痢

- 3 しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

用法・用量

次の量を服用して下さい。

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	2錠	1日3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しない ×	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 1 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
2 用法及び用量を厳守して下さい。

効能・効果

- ・しみ、そばかす、日焼けなどの色素沈着症
- ・全身倦怠
- ・二日酔
- ・にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ



裏面もお読み下さい→

成分・分量と作用

成分	成人1日量(6錠)中	作用
L-システイン	240mg	皮膚では、メラニン色素の発生を抑えることでしみ・そばかすを改善し、肝臓では、有害物を解毒することにより二日酔・全身倦怠に効果をあらわします。
アスコルビン酸	300mg	しみ・そばかすなどの原因となるメラニンの生成を抑制します。
パントテン酸カルシウム	24mg	脂肪代謝や糖代謝に働きかけ、滋養強壮に効果をあらわします。


添加物：アラビアゴム、カルナウバロウ、還元麦芽糖水アメ、ケイ酸Ca、サラシミツロウ、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セラック、ゼラチン、セルロース、タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素Ca、カルメロースCa

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 2 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 4 水分が錠剤に付きますと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、ぬれた手で触ったり、水滴を落としたりしないで下さい。
- 5 ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてありますので、キャップをあけた後は必ず捨てて下さい。
- 6 使用期限（外箱及びラベルに記載）をすぎた製品は服用しないで下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
明治薬品株式会社 お客様相談室
電話：☎0120-53-3451
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日、特定休日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
 **明治薬品株式会社**
富山県富山市三郷6番地

製造販売元
日本ビタミン化学株式会社
富山県富山市中大久保196-11