

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

L-システイン製剤

第3類医薬品

アンベリーホワイトCプラス

本製品は、肌や生体の代謝に関与するL-システイン及びメラニンの生成を抑えるアスコルビン酸(ビタミンC)にパントテン酸カルシウムを配合した製剤でしみ、そばかす、二日酔、全身倦怠にすぐれた効果を示します。

 使用上の注意


相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- しみ、そばかす、日焼けなどの色素沈着症 ●全身倦怠
- 二日酔 ●にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

【用法・用量】

次の量を服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	3回
7歳以上15歳未満	1錠	3回
7歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法及び用量を厳守してください
- 食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

— 裏面もお読みください —

【成分・分量】 1日量 (6錠中)

成 分	分 量	作 用
L-システイン	240mg	アミノ酸の1種で代謝酵素の活性を高め、メラニン色素の発生を抑えます。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	500mg	しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着を改善します。
パントテン酸カルシウム	24mg	疲労を防ぎます。

添加物：アラビアゴム、カルナウバロウ、還元麦芽糖水アメ、ケイ酸Ca、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セラック、ゼラチン、セルロース、タルク、炭酸Ca、乳酸Ca、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素Ca、カルメロースCa

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 水分が錠剤に付きますと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、ぬれた手で触ったり、水滴を落としたりしないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてありますので、キャップをあけた後は必ず捨ててください。
- (6) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

メラルーカ・オブ・ジャパン・インク

☎0120-515-054

受付時間：9時から18時まで(土、日、祝日を除く)

発売元 メラルーカ・オブ・ジャパン・インク 製造販売元 日本ビタミン化学株式会社
 東京都千代田区二番町5-6 富山県富山市中大久保196-11
<http://www.jp.melaleuca.com>

