

ビタミン含有保健薬

■使用上の注意 / 相換すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談し

関係部位	症状
皮膚	発疹等

てください
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■用法・用量 / 成人(15歳以上)1回1本、1日1回服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

■成分・分量(50mL中) / ロクジョウチンキ0.1mL (ロクジョウとして28.6mg) カルニチン塩化物50.0mg オキソアミチン100.0mg ニンジン乾燥エキス45.0mg(ニンジンとして671.6mg) チアミン塩化物10.0mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム5.0mg ビリドキシン塩酸塩10.0mg ニコチン酸アミド25.0mg 無水カフェイン50.0mg (添加物) 白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン

●リボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

●生薬成分配合のため、まれに澀濁を生じることがあります。

金属:キャップ ガラス:瓶

使用期限

製造番号

Kowa

強壮生薬エキス配合ドリンク剤

三才D^{コーフ}
100α

第3類医薬品

■効能・効果/滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・

病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・

発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの

場合の栄養補給

50mL

A



■保管及び取扱い上の注意 / (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

お問い合わせ先
興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月~金(祝日を除く)9:00~17:00

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

