



第2類医薬品

# 金粒 マムピン

(きんつぶ)

本品は古来漢方医に寵用されてきたまむし(学名: *Agkistrodon blomhoffii blomhoffii*)を骨子とし、各種ビタミンを配剤し、さらに薬用人参エキス、牛黄、牛胆、淫羊藿エキス等を配合し、金箔でコーティングした丸薬であります。



## 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心、胃部不快感、口内炎、下痢

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

## ■成分・分量 本品3丸中

成分	含 量	成分	含 量
まむし乾燥末	50mg	日局 チアミン塩化物塩酸塩	5mg
ニンジンエキス-P	90mg	日局 リボフラビン	5mg
イカリ草エキス	10mg	日局 ピリドキシン塩酸塩	10mg
牛 黄 末	2mg	日局 ニコチン酸アミド	25mg
牛 胆 末	50mg	日局 タウリン	100mg

添加物：コムギデンプン、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルスターチ、寒梅粉、金箔

## ■効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

## ■用法・用量

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1丸	3回 水にて食間 <sup>注)</sup> に服用してください。
15歳未満	服用しないでください。	

<sup>注)</sup> 食間とは、食後2～3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

## ■保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ■お客様相談室

TEL (06) 6131-1300

(祝祭日除く月～金 10:00～17:00)

製造販売元

— 阪本の赤まむし総本舗 —

株式  
会社 **阪本漢法製薬**  
大阪市北区曾根崎2丁目7番4号  
<http://www.sakampow.com>