

押して開ける

第2類医薬品

延若禿鶏内服液 30mL

[成分]1瓶(30mL)中  
 ゴミシ流エキス……0.1mL(100mg)  
 ニクジュヨウ流エキス ……0.1mL(100mg)  
 トシシ抽出液 ……0.5mL(100mg)  
 ジャシヨウシチンキ ……0.6mL(120mg)  
 オンジエキス ……54mg(302mg)  
 エゾウコギエキス ……25mg(500mg)  
 ニンジン乾燥エキス…210mg(3,134mg)  
 ロクジョウチンキ ……0.1mL(30mg)  
 豚胆汁エキス末 ……13.3mg(399mg)  
 ハンピチンキ ……0.25mL(50mg)  
 ゴオウチンキ ……0.25mL(2.5mg)

( )内は原生薬換算量  
 (アルコール0.87mL以下)  
 添加物として白糖、ハチミツ、クエン酸、ク  
 エン酸Na、dl-リンゴ酸、アルギン酸プロピ  
 レングリコールエステル、パラベン、安息香  
 酸Na、エタノール、香料を含有します。

《製品についてのお問い合わせ先》  
 救心製薬お客様相談室  
 ☎03-5385-3211(代表)  
 [受付時間] 9:00~17:00  
 (土、日、祝日、弊社休業日を除く)

《副作用被害救済制度のお問い合わせ先》  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
 ☎0120-149-931

®登録商標

救心製薬株式会社  
 東京都杉並区和田1-21-7

【効能】

次の場合の滋養強壮:虚弱体質、肉体  
 疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不  
 振、血色不良、冷え症

【用法・用量】

大人(15才以上)1日1回1瓶(30mL)  
 を服用すること

※15才未満は服用しないこと

☆本剤は生薬を配合していますので、ま  
 れに沈殿を生ずることがありますが、薬  
 効には影響ありません。よく振ってから  
 服用してください。

⚠ 使用上の注意

🗨 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合  
 は副作用の可能性があるので、直ち  
 に服用を中止し、この製品を持って医  
 師、薬剤師または登録販売者に相談  
 すること 皮膚:発疹・発赤、かゆみ
2. 長期連用する場合には、医師、薬剤師  
 または登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管  
 すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の  
 原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しない  
 こと



生薬滋養強壯剤

刺五加 人參 鹿茸 豚胆汁 反鼻 牛黄

延若禿鶏®

五味子 肉蓯蓉 菟絲子 蛇床子 遠志

内服液

第2類医薬品 30mL

生薬滋養強壯剤

刺五加 人參 鹿茸 豚胆汁 反鼻 牛黄

延若禿鶏®

五味子 肉蓯蓉 菟絲子 蛇床子 遠志

内服液

第2類医薬品 30mL