

ツムラの 滋養強壯剤

ワンテンPα

牛黄・鹿茸・人参・イカリ草・ニンニク・ローヤルゼリー配合



鹿茸

牛黄



大蒜

人参



王乳

イカリ草



ツムラ

第2類
医薬品

⚠〔使用上の注意〕



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
便秘、軟便、下痢。
4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

次の量を、水またはお湯と一緒にかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を守ってください。

(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔保管および取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

〔成分・分量〕 2カプセル中

ゴオウ……………2mg	イカリ草乾燥エキス……………20mg
ロクジョウ末……………10mg	(インヨウカクとして150mg)
加工大蒜……………20mg	トコフェロール酢酸エステル
(ニンニクとして2000mg)	……………50mg
ローヤルゼリー末……………50mg	フルスルチアミン塩酸塩
シベット散……………5mg	……………20mg
(シベットとして0.25mg)	リボフラビン酪酸エステル
ハンピ末……………20mg	……………12mg
カイクジン末……………20mg	ピリドキシン塩酸塩……………15mg
ニンジン乾燥エキス……………60mg	
(ニンジンとして870mg)	

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、エチルセルロース、ケイ酸Ca、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸Na・青色1号・赤色102号・黄色5号・ゼラチン(カプセル本体)

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。これは配合成分のリボフラビン酪酸エステルによるもので、ご心配ありません。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

発売元

 **株式会社ツムラ**
東京都港区赤坂2-17-11
〒107-8521

お客様相談窓口

電話 0120-329-930
<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元

大昭製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

