

販売名: 高砂コウジン

第3類医薬品

日本薬局方 **コウジン**

容量 500g 刻

Lot



袋の裏面も必ずお読みください。



高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

—— 保管及び取扱上の注意 ——

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります)
4. 気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封するとその効果は失われますので、次の点に御注意ください。
 - ・なるべくお早めに御使用ください。
 - ・輪ゴム、クリップ等で確実に封止して保管してください。(吸湿の防止・虫や異物混入の防止)

◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

日本薬局方

第3類医薬品

コウジン

高砂コウジン

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - ・医師の治療を受けている人。
 - ・妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・じんましん
消化器	軟便・下痢

3. 2週間服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】

次の場合の滋養強壮
虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、
食欲不振、血色不良、冷え症

【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1日量 10g を、
水 約 600 mL をもって煮て約 400 mL に
煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前
または食間 3 回に分服する。
(食間とは、食後2~3時間)

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20
お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)
機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>