

滋養強壯剤

人蔘ドリンク セパホルンZⅢ[®]

タウリン2000mg ローヤルゼリー

配合



第3類医薬品

販売名：セパホルンZⅢ

成分 本品1日量1本(100mL)中

チアミン硝酸物(ビタミンB₁).....10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)・3mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆).....5mg

ニコチン酸アミド.....12mg

無水カフェイン.....50mg

タウリン(アミノエチルスルホン酸)・・・2,000mg

ニンジンエキス(ニンジン1,443mgに相当)・130mg

オウギエキス(オウギ720mgに相当)・・・120mg

ローヤルゼリー.....100mg

添加物として、安息香酸Na、エドト酸Ca/2Na、

香料、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン

酸水和物、白糖、DL-リンゴ酸、カラメルを含有する。

＜成分に関連する注意＞本剤に含まれるリボフラビンリン

酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。

効能 滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・

胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後

などの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本(100mL)

を服用。15才未満は服用しないこと。

＜用法・用量に関連する注意＞

生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあります。

よく振って服用してください。

製造販売元 田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

副作用被害救済制度の問合せ先

☎0120-149-931

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。

ホームページ

www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 クラシエ薬品株式会社 東京都港区海岸3-20-20

®登録商標

OH03-U

18180