

開栓時に記入してください。

開 栓 年 月 日

品質保持の点から、開栓後
3週間以内に服用すること。

開栓後要冷蔵

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 開栓後はフタをしっかりとしめ、冷蔵庫に立てて保管すること。
5. 雑菌などの汚染の恐れがあるので、ビンの口に直接口をつけて服用したり、目盛り付きコップに入れたものをビンに戻さないこと。
6. 服用途中、味・においなどに変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。
7. ビンの口、目盛り付きコップは清潔に保つこと。
8. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号 使用期限(年.月)



キャップ：PP ・中栓：PP
フィルム：PET ・目盛り付きコップ：PS
ガラス：ビン

J24

第3類医薬品

500mL

滋養強壮

エンクレバン®

肝臓加水分解物 ビタミンB1・2・6・12 心臓エキス配合

効能効果

- 滋養強壮。
- 虚弱体質。
- 肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

用法用量

通常1日量30mLを2～3回に分けて随時服用する。
(計量には添付の目盛り付きコップを使用ください。
数字の単位はmLです。)

〈用法及び用量に関連する注意〉
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



ゼリア新薬

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
1歳未満の乳児。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分分量

30mL中

| 成分 | 分量 |
|---------------------------------|--------|
| 肝臓加水分解物 | 600mg |
| 心臓エキス | 300mg |
| チアミンジスルフィド(ビタミンB ₁) | 13.5mg |
| リボフラビン(ビタミンB ₂) | 3mg |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) | 3mg |
| シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂) | 30μg |

添加物：クエン酸水和物、パラベン、プロピレングリコール、pH調節剤2成分、香料、ハチミツ、白糖、ブドウ糖、カラメル
(成分分量に関する注意)
尿を黄変させることがある。

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 03-3527-3690

受付時間:9:00～17:50(土・日・祝日を除く)