

## 成分・分量1瓶(50mL)中

ゴオウ抽出液-A	0.5mL
(ゴオウ2mgに相当)	
リケン人參乾燥エキス	41mg
(ニンジン612mgに相当)	
ロクジョウ抽出液-A	0.4mL
(鹿茸20mgに相当)	
イカリソウ流エキス	0.2mL
(イカリソウ200mgに相当)	
ハンピ抽出液-A	0.4mL
(反鼻20mgに相当)	
セイヨウサンザシ抽出液-A0.3mL	
(セイヨウサンザシ70mgに相当)	
タウリン	1000mg
チアミン硝酸物(ビタミンB <sub>1</sub> )	10mg
リボフラビン酸エステルナトリウム(ビタミンB <sub>2</sub> )	5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	10mg
ニコチン酸アミド	20mg
無水カフェイン	50mg
添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸、dl-リンゴ酸、バラベン、安息香酸Na、プロピレングリコール、カラメル、香料、エタノール、バニリン、エチルバニリンを含有します。	
(アルコール0.5mL以下)	

※本剤に配合されているリボフラビン酸エステルナトリウムにより尿が黄色になることがあります。

## 効能・効果

滋養強壯、虚弱体質

肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

T1311H ガラス:瓶 金属:キャップ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



50mL

# 滋養強壯・栄養補給

人參・鹿茸配合

# ライフゲン<sup>®</sup> コンク

製造販売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お問い合わせ先 お客様相談窓口(土、日、祝日を除く)

電話 0748-52-1232 受付時間 9時～17時

## 使用上の注意

**相談すること** 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚:発疹・発赤、消化器:胃部不快感、下痢  
2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 用法・用量

大人(15歳以上)1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。  
※定められた用法・用量をお守りください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
  - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 本品は、生薬エキスを含む製剤ですので、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振って服用してください。

第2類医薬品

使用期限

製造番号

