

第2類医薬品

滋養強壯

六年根高麗  
紅蔘<sup>koyogen</sup>内服液

紅蔘3000mg配合

【用法・用量】

次の量を服用してください。

| 年齢        | 1回量         | 1日服用回数 |
|-----------|-------------|--------|
| 大人(15歳以上) | 1瓶(30mL)    | 1回     |
| 15歳未満     | 服用しないでください。 |        |

<用法・用量に関連する注意>

- 1) 定められた用法・用量をお守りください。
- 2) 本品は生薬成分を配合しているのので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりはありません。よく振ってから服用してください。

【効能・効果】

次の場合の滋養強壯:

虚弱体質、肉体的疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

日野薬品工業株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お客様相談窓口

☎0748-52-1232

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931



4 987403 580031

滋養強壯

六年根高麗  
紅蔘<sup>koyogen</sup>内服液

REGULAR

紅蔘3000mg



KOREAN RED GINSENG  
EXTRACT DRINK

第2類医薬品 30mL

第2類医薬品

滋養強壯

六年根高麗  
紅蔘<sup>koyogen</sup>内服液

紅蔘3000mg配合

この箱は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

販売名

皇養源内服液

△使用上の注意

■相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器  | 胃部不快感、下痢  |

2. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1瓶30mL中

コウジンエキス 1,200mg  
(日コウジンとして3,000mg)  
タイソウエキス 300mg  
(日コウジンとして1,000mg)  
ショウキョウエキス 27mg  
(日コウジンとして270mg)  
ケイヒエキス 11.7mg  
(日コウジンとして260mg)  
クコシエキス 25mg  
(日コウジンとして100mg)  
インヨウカクエキス 5mg  
(日コウジンとして50mg)

添加物として

水アメ、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸、クエン酸Na、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Naを含有します。