

鯉肝臓水解物配合 レバコール®

特徴

レバコールは、必須アミノ酸をはじめ、ビタミン及びミネラル等多種類の栄養素を含む新鮮な鯉の肝臓を加水分解したパンリパー末(鯉肝臓水解物)にチアミン硝化物、リボフラビンリン酸エステルナトリウム等を配合した保健栄養剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感
循環器	動悸

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢、便秘
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(16才以上)	10mL	1 回
	5 mL	2 回
8 才以上16才未満	5 mL	1 回
5 才以上8 才未満	3 mL	1 回
5 才未満	服用しないこと	

※添付の計量コップをご使用ください。

【用法・用量に関連する注意】

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- ビンに直接口をつけて飲まないこと。
- 計量コップに注いだ薬液をビンに戻さないこと。
- 開栓後、味・においに明らかな変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。

(裏面につづく)

〔成分・分量〕

1日量（10mL）中

成 分	含 量	成 分	含 量
パンリバー末	100mg	チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	10mg
チオクト酸	5mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB ₂)	3mg
パントテン酸カルシウム	10mg	ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	0.5mg
重酒石酸コリン	20mg	シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	3μg
イノシトール	5mg	L-グルタミン酸ナトリウム水和物	15mg
タウリン	30mg	L-トレオニン	1.5mg
ニコチン酸アミド	40mg	クエン酸鉄アンモニウム	30mg
グルクロノラクトン	5mg	ヨクイニンエキス(ヨクイニン煎出液)	3mL
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	5mg	グリチルリチン酸二アンモニウム	3mg
カフェイン水和物	10mg		

(アルコール0.5mL以下)

添加物としてケイヒチンキ、ショウキョウチンキ、ウイキョウチンキ、チョウジチンキ、サンショウチンキ、サフランチンキ、白糖、D-ソルビトール、滋養糖、クエン酸水和物、コハク酸、ハッカ油、カラメル、安息香酸Na、メタリン酸Na、ポリリン酸Na、パラベン、エタノールを含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

- (1) 本剤の服用により、便が黒くなる場合がありますが、クエン酸鉄アンモニウム等の鉄分を含有するためです。
- (2) 本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)を含有するためですから、ご心配ありません。
- (3) 天然物を使用していますので、製品ロットにより多少の色、味、香り等が異なる場合があります。
- (4) 気温や液温等により多少の色、味、香り等が異なる場合があります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、できるだけ速やかに服用すること。
- (5) 薬液を添付の計量コップに注いだ後は、ビンの口をよく拭いて清潔にすること。また、使用した計量コップは、その都度、水でよく洗うこと。
- (6) 水およびその他の異物が混入しないように注意すること。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
製造販売元 牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2