

壮若[®]

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

次の場合の滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	2 カプセル	3 回
7歳以上15歳未満	1 カプセル	
7 歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤6カプセル(3g)中

オウギ……0.008g
カンゾウ……0.041g
ケイヒ……0.069g
ジオウ……0.014g
シャクヤク……0.014g
センキュウ……0.01g
トウキ……0.014g
ニンジン……0.006g
ビャクジュツ……0.014g
ブクリョウ……0.014g
動物胆……0.055g

エキス……0.3 mL(固形物として0.045g)

ソウジュツ……0.003g
ブクリョウ……0.003g
ニンニク……0.107g

エキス……0.054g

サンヤク末……0.065g

ハンピ末……2.756g

添加物として黄色三二酸化鉄、酸化チタン、三二酸化鉄、ゼラチン、パレイショデンプン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

- ・本剤は黄褐色(キャップ)と淡黄色(ボディ)の二色のカプセル剤で、その内容物は黄褐色で、特異なおいを有し、味は苦い粉末です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 容器内には生薬のにおい防止の目的で活性炭タブレットを入れています。誤って服用しないようご注意ください。

壮若は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考慮して正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、壮若のことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

ご相談窓口

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願いします。

りんどう漢方薬品株式会社

電話 092(718)0055

受付時間 平日10:00~17:00

販売元：りんどう漢方薬品株式会社

〒810-0055 福岡市中央区黒門3-19

製造販売元：剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号