

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

補血滋養強壯剤

にん じん てつ りき あめ

日薬 人參鉄力飴

第2類医薬品

本剤は、生薬の人参末、サフラン末に鉄剤を配合した、虚弱、疲労、病後の体力低下に効果のある補血滋養強壯剤です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと 

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

貧血用薬

相談すること 

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師等の専門家に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 2週間位服用しても症状がよくなる場合。

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

便秘、下痢

〈成分・分量〉

1日量 (30g) 中

人参末	0.10g
サフラン末	0.10g
クエン酸鉄アンモニウム	0.05g
(添加物) 水飴	29.75g

〈効能・効果〉

次の場合の滋養強壮
虚弱体質、肉体疲労、病後の体力低下

〈用法・用量〉

次の1回量を1日3回、毎食後にさ湯にとかして服用して下さい。

年 齢	1回量
大人	約10g (添付匙 1 杯)
8歳以上15歳未満	約 5g (添付匙 1/2杯)
8歳未満	服用しないこと。

用法・用量についての注意

- (1) 服用の前後30分はお茶、コーヒー等を飲まないで下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えしないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

貯 置	注意事項
直射日光、高温・高湿	必須
湯煎、熱湯に加熱、湿不燃食、虫咬・小毒	厳禁

お問い合わせ先
 二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
 受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元 (製分・代販)
二反田薬品工業株式会社
 〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号

0.1g 未巻人
 0.1g 未巻人
 0.05g ムニ子にて焼通く工
 0.25g 湯水 (醇煎系)