

日本薬局方  
コウジン

《用法及び用量》

大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

《効能又は効果》

次の場合の滋養強壯

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え性



4 993512 420830

LOT 703306

500 g

第3類医薬品

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

# ⚠ 使用上の注意

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 血圧の高い人又は赤ら顔の人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って 医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤・かゆみ

3. 長期連用する場合は、 医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

□ 保管及び取扱い上の注意 □

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用ください。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。



株式会社 小島漢方

大阪市中央区常盤町2-2-19

TEL 06-6941-1643