

開豊瓊玉膏

【複方地黄人参蒸】

【製品の特徴】 瓊玉膏は生地黄の搾汁、人参末、ブクリョウ末、枸杞子末、沈香末、ハチミツを混合し、二重蒸気釜で蒸熟したのち、徐々に冷却させて製品としました。

瓊玉膏は、黒褐色、軟エキス様の独特の香りを持ち、甘味と多少の苦味を持った生薬製剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 次の場合の滋養強壮

食欲不振、肉体疲労、虚弱体質、病後の体力低下、胃腸虚弱、血色不良、冷え症、発育期

【用法・用量】 成人 …………… 茶匙 1杯量(約5g)

11才以上15才未満 …………… 茶匙 2/3量

8才以上11才未満 …………… 茶匙 1/2量

8才未満の小児 …………… 服用しないこと

そのまま、または温湯でうすめて1日1～2回服用する。

(添付の茶匙すりきり1杯は約5gです。)

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤の特性上、製品により色、味、固さに多少の差異を生じることがありますが、効能・効果に変わりありません。よくかきまぜてから服用してください。

【成分・分量】 本品100g中

生地黄の搾汁 …………… 32.0g

枸杞子末 …………… 0.9g

ニンジン末 …………… 2.8g

沈香末 …………… 0.1g

ブクリョウ末 …………… 8.0g

ハチミツ …………… 38.5g

【保管及び取扱い上の注意】 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

4. 服用に使用した茶匙は、清潔に保つようになしてください。

5. 服用後のピンは、割れることがありますので熱いお湯で洗わないでください。

【お客様相談窓口】 株式会社 栃本天海堂 品質保証部・品質保証課

電話番号 06-7711-0730 メールアドレス customer@tochimoto.co.jp

受付時間 10時～17時（土、日、祝日を除く）

【製造販売元】 株式会社 栃本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

【製造元】 廣東製藥株式會社

大韓民国製