

薬用陶陶酒銭形印

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください。
手術や出産直後等で出血中の人。
- 乗物又は機械類の運転操作を行う場合は服用しないでください。
(アルコールを含有するため)



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人1日 1～2回 1回20mL(添付・計量コップ)を服用

<用法・用量に関連する注意>

○用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】 1000mL中

成分	分量	成分	分量
蝮蛇蛋白分解物	1.5mL	カンパウチンキ	1mL
ハンピチンキ	0.6mL	チンピチンキ	0.3mL
ケイヒチンキ	4.6mL	DL-アラニン	195mg
ウイキョウチンキ	1mL	L-アスパラギン酸Mg.K	70mg
ニンジンチンキ	4mL	日局 L-アルギニン塩酸塩	24mg
ニクジョウチンキ	4.6mL	日局 タウリン	7000mg
ジャシウチンキ	4.6mL	日局 チアミン硝化物	50mg
クコシチンキ	6mL	日局 パントテン酸カルシウム	250mg
コズイシチンキ	6mL	L-グルタミン酸ナトリウム	24mg
タイソウチンキ	1mL	日局 グリシン	195mg
インヨウカクチンキ	1mL	日局 L-スレオニン	24mg
ガジュツチンキ	0.3mL	日局 L-ノバリン	30mg

アルコール分 29%v/v

添加物としてエタノール、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、香料を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 瓶の口から直接飲んだり、キャップを開け放しにしないで下さい。
- 使用後は、瓶の口を清潔にしてキャップをしっかりと締めて下さい。
- 気温や身体の調子で時に風味が変わった様に感じられることがありますが、品質の変化ではありません。
- 本剤は、天産物を原料としており、気候や気温の変化により沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、そのまま服用して下さい。

製造販売元 **陶陶酒製造株式会社**

茨城県かすみがうら市下稻吉2762

発売元 **株式会社陶陶酒本舗**

本社 東京都新宿区天神町6番地

電話 03(5229)1011(代)

お問い合わせはお客様総合相談室へ ☎0120-039-064

<http://www.tohtohshu.co.jp>

E-mail info@tohtohshu.co.jp