

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。



たまつた疲れに  
**サモンGX**

第2類医薬品

〈滋養強壮保健薬〉

強壮生薬、ビタミン、アミノ酸 17成分配合

- ◆サモンGXは、滋養強壮に用いられてきた薬用人参をはじめ、ニンニク、地黄(レマネジン855)などの生薬6種と、ビタミン7種、アミノ酸4種を配合した滋養強壮保健薬です。
- ◆仕事や家事など、毎日の生活の中で、疲れは全身に少しづつたまっていきます。
- ◆このような疲れがたまつた方や体力の衰えが気になる方、食欲がない方などにおすすめです。



## 使用上の注意



### 相談すること



- ① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

軟便、下痢

- ③ 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能

★滋養強壮

★虚弱体質

★肉体疲労・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・病中病後・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください

朝・夜なるべく食後に服用してください。

年 令	1回 量	服 用 回 数
成人(15才以上)	2錠 ● ●	1日2回
15才未満	服用しないこと	

### [注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。  
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)
- (3)びんの中の包装紙に包まれた物は乾燥剤ですので服用しないでください。

### 最初に服用する時に

- ★詰め物を取り出して捨ててください。  
(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)



# 成 分

4錠(1日量)中

6種の強壮生薬

ニンジン乾燥エキス-A (人参600mgに相当)	60mg	オウギ(黄耆)末	50mg
-----------------------------	------	----------	------

オキソアミヂン末 (ニンニク5000mgに相当)	50mg	イカリソウ乾燥エキス-A (淫羊藿500mgに相当)	50mg
-----------------------------	------	-------------------------------	------

レマネジン855(地黄エキス) (地黄200mgに相当)	100mg	カシュウ乾燥エキス-A (何首烏300mgに相当)	30mg
---------------------------------	-------	------------------------------	------

7種のビタミン

塩酸ジセチアミン (ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	10mg	リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル)	12mg
--------------------------------------	------	---	------

ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	15mg	アスコルビン酸カルシウム (ビタミンCカルシウム)	90mg
------------------------------------	------	------------------------------	------

酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	10mg	パントテン酸カルシウム	30mg
-----------------------------	------	-------------	------

		ニコチン酸アミド	25mg
--	--	----------	------

4種のアミノ酸

L-アルギニン塩酸塩	50mg	カルニチン塩酸塩	50mg
------------	------	----------	------

DL-メチオニン	40mg	L-トレオニン	25mg
----------	------	---------	------


添加物：二酸化ケイ素、酒石酸、ヒプロメロース、乳酸Ca、硬化油、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、マクロゴール、酸化チタン、アラビアゴム、タルク、ポビドン、カルナウバロウ、黄色5号、白糖

**[注意]**

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります、これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00 (土、日、祝日を除く)

発売元

**大正製薬株式会社**

東京都豊島区高田3丁目24番1号

製造販売元

**ジェーピーエス製薬株式会社**

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)