

販売名 撫滋快<sup>®</sup> 3000

服用に際しては、説明書を必ず読むこと

成分・分量 1日量(100mL)中

イカリソウエキス(原生薬換算量100mg)10mg、ハゲキテン流エキス(原生薬換算量200mg)0.2mL、タウリン3000mg、リボフラビン2mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド25mg、無水カフェイン50mg。添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、ブドウ糖、安息香酸Na、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料を含有します。(アルコール0.2mL以下)

(注意)本剤に含まれているリボフラビンにより、尿が黄色くなる場合がありますが心配ありません。

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。\*15歳未満は服用しないでください。(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には変わりありませんので、よく振ってから服用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)開栓後の保存及び他の容器に入れ替えをしないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)(4)使用期限のすぎた製品は服用しないでください。

# 植物性強壯生薬

イカリソウ100mg・ハゲキテン200mg  
(原生薬換算量)

滋養強壯・栄養補給

ブ ジ カイ  
撫滋快<sup>®</sup>



# 3000

タウリン 3000mg

ビタミン B<sub>2</sub> B<sub>6</sub> 配合

100mL

第2類医薬品

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

効能・効果

●滋養強壯●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

使用上の注意 相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹 消化器：胃部不快感(2)服用後、次の症状があらわれることがあつたので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢(3)しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造 販売元 **ドルド製薬** 有限会社

岐阜県羽島市足近町1-30-1

●お問い合わせ先 ☎058-392-6564

ガラス：瓶 金属：キャップ

使用期限 製造番号

