

あったら
いいな

をカタチにする

小林製薬

製品特徴

デリケートな女性の身体を考えて作られたお薬です。女性ホルモンと自律神経のアンバランスから起こる身体の不調を改善し、前向きな生活をサポートします

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

第2類医薬品

開け口

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限(パッケージ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

販売名:女性保健薬 命の母A Health Promoting Drug for Women

← チャック

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること

🗨 **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦または妊娠していると思われる人(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(5)胃腸が弱く下痢しやすい人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること:便秘、下痢
4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 更年期障害、更年期神経症、血の道症注)、のぼせ、生理不順、生理異常、生理痛、肩こり、冷え症、肌荒れ、めまい、耳鳴り、動悸、貧血、にきび、便秘、ヒステリー、帯下、産前産後、下腹腰痛、
血圧異常、頭痛、頭重 注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴ってあらわれる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである

用法・用量 1回4錠、1日3回毎食後に服用する ●15才未満は服用しないこと **成分・分量** 1日量(12錠)中
ダイオウ末175mg カノコソウ末207mg ケイヒ末170mg センキュウ末100mg ソウジュツ末100mg シャクヤク末
300mg ブクリョウ末175mg トウキ末300mg コウブシ末50mg ゴシュユ40mg ハンゲ75mg ニンジン末40mg コウカ
50mg チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)5mg リボフラビン(ビタミンB2)1mg ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)
0.5mg シアノコバラミン(ビタミンB12)1μg パントテン酸カルシウム5mg 葉酸0.5mg タウリン90mg dl-α-トコフェ
ロールコハク酸エステル(ビタミンE)5mg リン酸水素カルシウム水和物10mg ビオチン1μg 精製大豆レシチン10mg
添加物として、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、セラック、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、バレイシヨテンブン、ゼラ
チン、白糖、エリスロシン、ニューコクシン、サンセットイエローFCF、ミツロウ、カルナウバロウを含有する

保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックをしっかり
しめて保管すること (2)小児の手の届かないところに保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)本剤をぬれた手で扱わないこと (5)乾燥剤は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

(上段)使用期限(西暦年.月)/(下段)製造番号

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



MADE IN JAPAN

10138537